

DIFTAVAX[®]

Προσοφημένο εμβόλιο έναντι της Διφθερίτιδας και του Τετάνου για ενήλικες και εφήβους

Η απαραίτητη διπλή προστασία έναντι Διφθερίτιδας και Τετάνου[†]



[†] Σύμφωνα με τις θεραπευτικές ενδείξεις το Diftavax ενδείκνυται για την ανοσοποίηση ατόμων ηλικίας άνω των 7 ετών, είτε ως αρχικός είτε ως αναμνηστικός εμβολιασμός¹

- Περιεκτικότητα σε αντιγόνο Διφθερίτιδας, ειδικά για αναμνηστική δόση¹
- 1 μόνο ένεση έναντι του Τετάνου και της Διφθερίτιδας¹
- Σύμφωνα με το ΝΕΟ ΕΠΕ Ενηλίκων 2020-2021, το Diftavax συστήνεται²:
 - ✓ Ως αρχικός εμβολιασμός σε μη εμβολιασμένα άτομα >27 ετών
 - ✓ Ως αναμνηστικός εμβολιασμός σε εμβολιασμένα άτομα >27 ετών ανά 10ετία
 - ✓ Στον τραυματισμό
- Καλό προφίλ ασφάλειας¹

DIFTAVAX®

Προσοφημένο εμβόλιο έναντι της Διφθερίτιδας και του Τετάνου για ενήλικες και εφήβους

Η απαραίτητη διπλή προστασία έναντι Διφθερίτιδας και Τετάνου

Ενδείξεις εμβολιασμού στον τραυματισμό βάσει του ΕΠΕ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2020-2021²

Εμβόλιο/Ανοσοσφαιρίνη	Καθαρά, ελάσσονα τραύματα		Όλα τα λοιπά τραύματα*	
	DTaP ή Tdap/Td/Tdap-IPV†	TIG	DTaP ή Tdap/Td/Tdap-IPV†	TIG‡
Ιστορικό Εμβολιασμού				
Άγνωστο ή λιγότερες από 3 δόσεις	Ναι	Όχι	Ναι	Ναι
3 ή περισσότερες δόσεις	Όχι [§]	Όχι	Όχι [¶]	Όχι

TIG: Αντιτετανική Ανοσοσφαιρίνη

• Σε όλα τα καθαρά, ελάσσονα τραύματα ή ρυπαρά τραύματα (με χρώμα, κόπρανα ή σίελο), χορηγείται εμβόλιο Td/Tdap ή επί ελλείψεως, Tdap-IPV (Το εμβόλιο Tdap προτιμάται έναντι του Td για ενήλικες που δεν έχουν ποτέ εμβολιαστεί με Tdap) σε ασθενείς με άγνωστο ή ελλιπές ιστορικό εμβολιασμού (< από 3 δόσεις).

• Σε περίπτωση ρυπαρού τραύματος και εφόσον έχουν παρέλθει ≥ 5 έτη από την τελευταία δόση εμβολίου που περιέχει τοξοειδές τετάνου, θα πρέπει να χορηγηθεί εμβόλιο Td/Tdap ή επί ελλείψεως, Tdap-IPV. Στην περίπτωση αυτή ΜΟΝΟ, η χορήγηση της ανθρώπινης αντιτετανικής ανοσοσφαιρίνης (TIG) ταυτόχρονα, με 1 αναμνηστική δόση εμβολίου Td ή Tdap, χορηγείται ως προφύλαξη σε άτομα με ελλιπές (< 3 δόσεις εμβολίου που περιέχει τοξοειδές του τετάνου) ή άγνωστο ιστορικό εμβολιασμού, καθώς και όταν έχουν παρέλθει ≥ 5 έτη από τον τελευταίο εμβολιασμό.

* Όπως, για παράδειγμα, στις περιπτώσεις πρόσφατου ρυπαρού τραύματος (με χρώμα, κόπρανα ή σίελο), συμπεριλαμβανομένων και των θλαστικών ή διαπτεραινωτών τραυματιών, των εγκαυμάτων ή του κρυσπαγήματος, καθώς και εκείνων από δήγματα ζώων ή βλήματος

† Το εμβόλιο Tdap προτιμάται έναντι του Td για ενήλικες που δεν έχουν ποτέ εμβολιαστεί με Tdap.

‡ Άτομα με HIV λοίμωξη ή σοβαρή ανοσοεπάρκεια που έχουν επιμολυσμένα τραύματα (συμπεριλαμβανομένων των μικρών τραυμάτων) θα πρέπει επίσης να λάβουν TIG, ανεξάρτητα από το ιστορικό εμβολιασμού έναντι του τετάνου.

§ Ναι, εάν έχουν παρέλθει δέκα ή περισσότερα (≥ 10) έτη από την τελευταία δόση εμβολίου που περιέχει τοξοειδές τετάνου.

¶ Ναι, εάν έχουν παρέλθει πέντε ή περισσότερα (≥ 5) έτη από την τελευταία δόση εμβολίου που περιέχει τοξοειδές τετάνου.

Βιβλιογραφία:

1. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Diftavax, Νοέμβριος 2019.

2. Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας Αρ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.74363, 19-11-2020 «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2020-2021».



BIANEX A.E. - Έδρα : οδός Τατοΐου, 18^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής,
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113,
562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

SANOFI PASTEUR

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

SE0032DIF/2-1/2021